

老年性黃斑部病變

什麼是老年性黃斑部病變？

黃斑部就是視網膜正中心部位，負責微細中心視力以及大部分色彩視力。黃斑部會因老化以及氧化傷害，而產生老年性黃斑部病變。

老年性黃斑部病變的分類

乾性

與濕性相比下，病情惡化速度較為緩慢，隨著時間變化，可能產生新生血管使病情轉為濕性，須定期追蹤。

濕性

濕性的老年性黃斑部病變中，新生血管在脈絡膜長出。有時這些血管滲漏導致視力模糊或視覺扭曲。如果沒有及時治療，可能導致嚴重的視力損失

常見症狀有哪些？

1. 視物扭曲變形



2. 視力減退模糊




3. 中心盲點或黑影




如何自我檢查？

阿姆斯勒方格表



1. 把方格表放在眼前30公分之距離，光線要清晰及平均。
2. 如有老花或近視，須配戴原有的眼鏡進行測試。
3. 先用手蓋著左眼，右眼凝視方格表中心黑點。
4. 重複步驟1~3檢查左眼。

若有以下情況或症狀惡化需接受進一步檢查



濕性老年性黃斑部病變的治療有哪些？

1. 眼球內注射抗血管新生藥物療法

過多的VEGF(血管內皮細胞生長因子)會促進新生血管的生長。將VEGF之抗體注射到玻璃體內，藉此抑制新生血管增生。



Avastin(癌思停)：健保未給付項目，屬於適應症外之使用，具有抑制新生血管之療效，目前無已知的毒性或副作用。

Lucentis(樂舒睛)：衛生署通過專門使用於眼睛之藥物，少數符合條件之病患可專案申請健保給付，其餘仍須自費購買。

2. 光動力療法

3. 雷射光凝固療法

4. 合併治療

