

## 視舒坦倍潤濕\*人工淚液點眼液

### SYSTANE\* BALANCE Lubricant Eye Drops

衛部藥輸字第 026183 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

#### 【產品敘述】

SYSTANE\* BALANCE 獨特的 LipiTech™ 設計，經臨床驗證可有效延長淚膜維持時間，緩解眼睛乾燥所帶來的不適，使眼睛得到潤澤與舒適。

#### 【成分】

每毫升中：

**有效成分及含量：Propylene Glycol ... 6.0 mg**

其他成分包含 boric acid、dimyristoyl phosphatidylglycerol、edetate disodium、hydroxypropyl guar、mineral oil、polyoxyl 40 stearate、0.001% 之 POLYQUAD\* (polyquaternium-1) 作為防腐劑、sorbitan tristearate、sorbitol 及純水。hydrochloric acid 及/或 sodium hydroxide 用以調整 pH 值。

#### 【用途(適應症)】

暫時緩解因眼睛乾澀所引起的灼熱感及刺激感。

#### 【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。

三、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 使用前，請洗淨雙手。
4. 請依照藥品標示使用。
5. 開瓶後 25°C 下封蓋儲存
6. 以下情形，請勿繼續使用。
  - 超過保存期限的眼藥水。
  - 開瓶 28 天 ( 四週 ) 後請勿繼續使用。
  - 藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
7. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
8. 如需同時使用兩種眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
  - 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
  - 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
9. 配戴隱形眼鏡時，請勿點用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。

### 【用法用量】

使用前請先搖晃。

一天 3 至 4 次，每次 1 至 2 滴。

### 【警語】

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 連續使用三天（或 72 小時）症狀未改善。
2. 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
3. 若有任何不適情況產生。
4. 使用後發生過敏反應。

### 【包裝】

100 毫升以下塑膠瓶裝。

### 【儲存】

30°C 以下。

**Alcon**<sup>®</sup>  
a Novartis company

製造廠： Alcon Research Ltd.

廠 址： 6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134, USA

藥 商： 台灣諾華股份有限公司

地 址： 台北市中正區仁愛路二段 99 號 11 樓

\*商標為 Novartis 所擁有

© 2016, 2018 Novartis