

# “皇家”免孕吐膜衣錠

## “Royal” Bendol F.C.Tablets

### 衛署藥製字第 26872 號

懷孕婦女十之八九都會發生噁心及嘔吐的現象(morning sickness)，尤其好發生於懷孕後的第一個週期(即前三個月，first trimester)有些孕婦只要稍事休息，即可緩和症狀，但是有些孕婦則嚴重到無注攝食的程度。如此營養的供給勢必不充足，非但影響胎兒的發育，也影響母體的健康。因此藥物的應用為亟需的，然而抑制噁心嘔吐的藥物大都對胎兒有害，所以適當藥物的選用遂成為一大課題。免孕吐膜衣錠之成分處方，呈於 1956 年 Merrell 藥廠就已經開發，其間經過 20 多年的臨床使用，並沒有發現致畸胎的副作用，因此美國 FDA 也已承認其藥效與安全性，本公司為提供我國孕婦安全、有效之藥物，特別引進此處方。

「主成份」：每一膜衣錠含有：

Doxylamine Succinate 10mg

Pyridoxine Hydrochloride 10mg

「藥理特性」：

1. 本品臨床使用 20 多年，超過一千萬個個案，均證明效果卓越，且沒有致畸胎之副作用發現。
2. Doxylamine succinate 為一長效型抗組織胺劑，能有效地抑制妊娠的噁心及嘔吐。
3. Pyridoxine HCl (Vit B<sub>6</sub>) 是一種必需維生素，臨床上能有效的緩解孕婦的噁心及嘔吐，而且對於月經前之各種不適症狀亦有效，可見其對於婦女之重要性，但其真正之作用機轉尚未能十分明瞭。
4. 如遇到極嚴重的病患，無法控制時，可考慮併用 Dicyclomine HCl 10mg，以緩解胃部痙攣現象。

「適應」：

妊娠婦之噁心及嘔吐之緩解

「用法用量」：

通常於睡前服用二粒，嚴重之患者或白天也發生病況之患者，可於早晨及午後各追加服用一粒。本藥須由醫師處方使用。

「注意事項」：

1. 本品可能造成倦怠的作用，因此有駕車及操作機械的孕婦應小心使用。
2. 動物試驗研究(老鼠、兔子)，即使是服用人類極量的 90 倍，也沒有致畸胎的現象發生。
3. 為了研究本品是否可能會導致畸胎，本品曾經被許許多多的學者研究過(epidemiologic studies)，並且獲致一個結論就是：依現有的資料顯示本品和畸胎並沒有關係，但是有極少數的研究指出本品可能會造成特定的先天性缺陷，然而這些報告的缺陷又個個不同，因為這些報告僅是假設而已，並沒有肯定的證據。
4. cohort studies 的結果指出，雖然不能充分的排除畸胎的敏感度，但是畸胎確有漸增的趨勢，因此本品最好是當其他非藥物控制無效時，才考慮使用。

「藥物相互作用」：

1. 和酒精、中樞神經抑制劑及三環抗憂鬱劑會產生彼此的加強作用。
2. Pyridoxine 會促進 levadopa 的代謝，不可合併使用。
3. MAOI 會加強 doxylamine 的 antimuscarinic 作用，不可合併使用。
4. 其他如膀胱頸狹窄、心臟血管疾病、青光眼、高血壓、甲狀腺亢進、前列腺肥大、幽門十二指腸道狹窄等疾患，均應小心使用。

「副作用」：

本品較常見的副作用為眩暈、倦怠、氣管分泌物濃稠及胃痛、其他如模糊視、口乾、頭痛、食慾低、神經質、出汗、發疹等，非常的少見。

「包裝」：

100, 600, 1000 粒瓶裝

 **皇佳化學製藥股份有限公司**  
**ROYAL CHEM. & PHARM. CO., LTD.**  
高雄縣鳥松鄉松埔路1巷1號 電話：(07)7310537~8