

“信東”安謀黴素膠囊 250 毫克 / 500 毫克 Amoxicillin Capsules 250mg / 500mg “TBC”

本藥是一種類似安比西林(Ampicillin)而比安比西林更廣效之半合成抗生素。對於革蘭氏陽性菌與革蘭氏陰性菌有強力的直接殺菌作用，經口投與吸收後所產生的血中濃度約為 Ampicillin 的 2 倍，於組織中穿透力強，膿性痰、粘液痰中也能移行，膽汁中濃度高。本藥在體內代謝少，很少與血清蛋白結合。於動物實驗結果，對病原菌感染有防禦效果，為 Ampicillin 的 2 倍以上，且毒性小，耐力高，吸收亦不受飯食影響。

【組成】

“信東”安謀黴素膠囊 250 毫克

主成分：每粒膠囊中含有：

Amoxicillin Trihydrate.....250mg (Potency 力價)

賦形劑：Sodium Lauryl Sulfate、Magnesium Stearate、Talc、Capsule Shell(含 Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF)。


“信東”安謀黴素膠囊 500 毫克

主成分：每粒膠囊中含有：

Amoxicillin Trihydrate.....500mg(Potency 力價)

賦形劑：Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Capsule Shell(含 Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF)。

結構式：6-[D(-)- α -amino- α -(p-hydroxyphenyl)acetamido]Penicillanic acid Trihydrate。



【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
(效能)

1. 呼吸道感染：支氣管炎、肺炎、咽頭炎、扁桃腺炎。
2. 膽道感染症：膽管炎、膽囊炎。
3. 尿道感染症：腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎。
4. 生殖器感染：淋病、前列腺炎、副睪丸炎、子宮附屬器炎、子宮內膜炎、骨盤腹膜炎。
5. 皮膚及軟組織感染：毛囊炎、膿皮症、膿痂疹、癬、癰、疔瘡、膿瘍、蜂窩組織炎、壞疽、褥瘡、乳腺炎、淋巴節炎。
6. 眼瞼炎、淚囊炎、麥粒腫、中耳炎、耳痛、鼻痛、齒槽膿瘍、顎炎。
7. 骨膜炎、骨髓炎、猩紅熱、敗血症、細菌性心內膜炎。
8. 創傷及手術後二次感染。

【用法·用量】

成人：一次口服 250mg，一日 3~4 次。

小孩：依體重每日 20mg~40mg/kg，分 3~4 次服用。

病情嚴重時，可酌予增量服用。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 對青黴素過敏者，不宜使用本藥。
2. 服用本藥如有眩暈、噁心、嘔吐、耳鳴、口內異常感等現象，應予停藥。
3. 關於妊娠期投與之安全性，尚未確立，使用應慎重注意。

【保存條件】

儲存於 25°C 以下。

【包裝】

6~1,000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

“信東”安謀黴素膠囊 250 毫克 / 500 毫克 衛署藥製字第 023264 號 / 023239 號

委託者：信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路 22 號

製造廠：榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路三段 447 號

50100053 ①