

## 疝氣及腹股溝手術

### 手術（或醫療處置）：

疝氣可分為間接型或直接型疝氣。間接型疝氣是因為由腹膜延伸之突起袋為完全關閉而形成疝氣袋；直接型疝氣則是由腹肌較鬆之缺口裂開處膨出，而形成疝氣。一旦疝氣袋形成後，腹腔中的器官，如小腸，可能墜入疝氣袋中，因擠入袋中的腸子無法推回腹腔中時，腸道可能阻塞或壞死，而有生命危險。

1. 半身或全身麻醉施行。
2. 由腹股溝處進行手術。
3. 疝氣手術需切除脫垂之疝氣囊，並將脫垂之腹腔組織推回腹腔。
4. 有時會需要使用健保不給付、需自費的器材修補疝氣，此時病患須負擔額外費用。

### 手術效益：

疝氣手術可以改善生活品質，避免脫垂之腸道組織壞死。

### 手術風險：

1. 傷口出血，血腫(<1%)
2. 傷口感染(<1%)
3. 傷口疼痛(<5%)
4. 陰囊血腫(<5%)
5. 可能再發。傷口硬塊，要數週才會消腫或軟化。
6. 其他

### 替代方案：

疝氣雖無立即的危險，但積極性的治療，唯有手術才能達成。其他如疝氣帶的治療，只有暫時性的效果。